

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w roku 2015




Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce

- Program Zdrowotny jest krokiem w kierunku wypełnienia luki w obecnie obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych
- Program Zdrowotny jak zdecydowana większość samorządowych programów profilaktycznych prowadzonych w Polsce, zbliża nas do Europy, której kraje już dawno prowadzą powszechną profilaktykę zakażeń HPV;
- Realizatorem Programu Zdrowotnego jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie;
- Program Zdrowotny realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego;
- Więcej informacji na temat Programu Zdrowotnego oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. profilaktyki zakażeń HPV znajduje się na www.profilaktykawmalopolsce.pl

Co to jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?

Wirus brodawczaka ludzkiego jest bardzo pospolity i wysoce zakaźny.

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) **80%** aktywnych seksualnie kobiet bezpośrednio styka się w ciągu swego życia z tym wirusem.



HPV to skrót angielskiej nazwy wirusa brodawczaka ludzkiego (*Human Papilloma Virus*).

#profilaktykaHPV

**Zakażenia wirusem
brodawczaka
ludzkiego /HPV/
są bardzo powszechne.**



Uważa się, że na świecie ok. **15-20%** populacji jest w tym momencie zakażona wirusem HPV,

50% z nich to kobiety i mężczyźni w wieku 15-25 lat.

#profilaktykaHPV



Prawie **50%** zakażeń jest wywoływane rakotwórczymi typami wirusa, a ponad **80%** zakażeń HPV to zakażenia bezobjawowe, samoistnie przemijające.



#profilaktykaHPV

Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek.




Zakażenia przenoszone są drogą płciową, w tym także poprzez zainfekowaną skórę w kontakcie „skóra-skóra”.

#profilaktykaHPV

SKALA PROBLEMU ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV

Występuje ponad **200 TYPÓW WIRUSA HPV**,
wśród nich **typy 16 i 18** wywołujące **70%**
zakażeń prowadzących do zmian
nowotworowych, m.in. raka szyjki macicy.

Pozostałe typy wywołują inne choroby




#profilaktykaHPV

Ryzyko zakażenia występuje od chwili inicjacji seksualnej.

Badania wykazały, że do infekcji dochodziło:

- w **20% w ciągu 1 roku** od rozpoczęcia inicjacji seksualnej
- w blisko **50% w ciągu 2 lat** po inicjacji seksualnej



#profilaktykaHPV



+



/



szczepienia ochronne

+

badania ginekologiczne/ cytologiczne

=

mniejsze ryzyko raka szyjki macicy

Nie ma leku, który zwalczy wirus HPV zaraz po jego dostaniu się do organizmu.

#profilaktykaHPV

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV



Tylko pełna profilaktyka – badania plus szczepienia – jest najefektywniejszym sposobem ochrony przed rozwojem chorób nowotworowych.

Szczepienie nie zapewnia ochrony przed wszystkimi istniejącymi typami wirusa HPV, ale chroni przed zakażeniem **NAJCZĘŚCIEJ** występującymi typami wirusa.

#profilaktykaHPV

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV



- Szczepionka jest podawana domięśniowo (w zastrzyku) w dwóch lub trzech oddzielnych dawkach w ciągu 6 miesięcy
- Szczepionkę można stosować u dziewczynek, które ukończyły 9 lat.
- Po każdym szczepieniu należy pozostać w punkcie szczepień jeszcze przez **ok. 15 minut**,

#profilaktykaHPV

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV



Szczepienie jest bezpieczne - świadczą o tym liczne badania kliniczne stosowanych szczepionek przeprowadzane na pokaźnych grupach dziewcząt i młodych kobiet oraz doświadczenia krajów prowadzących od lat masową profilaktykę zakażeń HPV, w trakcie których podano już ponad 150 milionów dawek szczepionki przeciw zakażeniom HPV.

#profilaktykaHPV

Przeciwwskazania do szczepienia przeciw zakażeniom HPV

Czasowe:

- ostra choroba infekcyjna z gorączką
- zaostrzenie choroby przewlekłej
- leczenie obniżające odporność
- ciąża

Stałe:

- Wstrząs anafilaktyczny na poprzednio otrzymaną dawkę szczepionki

#profilaktykaHPV

Niepożądane odczyny poszczepienne

Odczyny miejscowe:

zaczerwienie, obrzęk, ból
w miejscu podania szczepionki;

Odczyny ogólne:

gorączka, zespół zmęczenia, ból głowy, nudności

**Objawy te zazwyczaj przemijają w ciągu
1-2 dni po szczepieniu.**

#profilaktykaHPV

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM HPV



Szczepionka daje długą, wieloletnią odporność.



Pamiętajmy, że zapobieganie chorobie jest zawsze lepsze od jej leczenia.



#profilaktykaHPV

Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w roku 2015

Dziękujemy za uwagę



Więcej informacji na www.profilaktykawmalopolsce.pl

#profilaktykaHPV